

В. ОСИПОВ,
корреспондент ТАСС.

Р. САШИН.

работ. поперечных реб

Помимо технологических технических разработок нам много приходится заниматься подготовкой документации. Поэтому в правильной организации этого труда мы видим немалый резерв экономии полезного времени.

Фото Б. СТЕПАНОВА

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Основная работа в это время должна быть направлена по борьбе с вредителями и болезнями. Во время цветения черной смородины выявляют и уничтожают кусты, пораженные махровостью. А когда цветение закончится

Фото Б. Степанова

Кусты заселены пчелами и тлей, жуки-распороты хлорофоса добавляют карбофос (30 граммов) или трихлорметафос-3 (20 граммов).

Кусты черной смородины, пораженные смородиновым почковым клещом, обрабатывают повторно суспензией коллоидной серы (75 граммов на 10 литров воды). Против мучнистой росы на крыжовнике.

Сразу же после цветения

В. СНЕГОВСКИЙ
ИТАСС

да с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблонной моли.

Нужно помнить, чтобы уберечь от отравления, растения обрабатывают ядохимикатами по мере цветения. На участках, где расположены ульи, опрыскивания проводят рано утром, а лучше всего поздно вечером, когда пчелы находятся в ульях, летки и торцы на это время закрыты, а сами ульи прикрыты фанерой или другими материалами. По окончании работы, перед тем как покинуть пчеловодный пункт, нужно протереть последние дощечки улья, покласть в него химикаты, обработав оповещатель заваливающим веществом, а после этого

Л. КОНСТАНТИНОВ
старший инженер агромет-
станции «Ленино-Дачное»